épaules, un peu de duvet gris aux bords, en arrière, sur les côtés ainsi qu'aux sutures, enfin, sur le disque, où il forme deux bandes longitudinales grisâtres; extrémité de l'écusson couverte d'un pareil duvet; pointes fauves à l'extrémité; balanciers testacés, massue blanche; abdomen avec une bande médiane, allant du 3e segment jusqu'à l'extrémité, de chaque côté, sur les bords postérieurs des segments, 3 larges macules formées par un fin duvet blanchâtre, ventre couvert de duvet gris; pieds bruns, base des cuisses fauve, genoux et base des tibias testacés; tarses intermédiaires et postérieurs, largement, d'un testacé blanchâtre, tarses antérieurs un peu brunâtres, à base moins pâle; ailes presque hyalines, stigmate brunâtre, une large bande diffuse près de l'extrémité et une tache semblable au bord interne, roussâtres.

Nova-Guinea. — Ma collection.

Genre CHRYSOCHLORA (Latr.).

C. PLURICOLOR ♀ (mihi). — Long. 17 mill.

Antennis fulvis, chæto nigro; palpis testaceis; haustello pallidè flavo; facie, vel flavidâ, vel prasinâ, fronte simillimâ, castaneo vittatâ; thorace viride, fusco et rufo picto; scutello flavido vel viride, basi nigro; halteribus testaceis, apice viridi-coloribus, lateribus ejusdem coloris et nigro maculatis; abdomine nigro fusco, apice rufo castaneo obscuro, vittis tribus transversalibus, arcuatis, flavidis, et strigâ longitudinali mediană, basi flavidâ, deinde rufâ, segmento primo, basi et, utrinque, flavido vel viride, ventre rufo, basi viridi-colore; pedibus fulvis; alis ferè hyalinis, apice parum cinereis, extrinsecus venisque testaceis.

Antennes fauves, brunâtres à l'extrémité, chète noirâtre; palpes testacés, trompe d'un testacé verdâtre; face verte ou jaunâtre, une large bande, d'un brun roussâtre, allant du vertex jusqu'auprès de la base des antennes, occiput jaune ou vert; thorax vert ou jaunâtre, bords antérieurs et latéraux, deux larges macules trapézoïdales de chaque côté, une demi-bande médiane, allant de la suture à l'écusson, larges macules irrégulières sur les flancs, d'un noirâtre luisant, une large demi-bande médiane, prolongée du bord antérieur à la suture, fauve rougeâtre; écus-

son verdâtre ou jaunâtre, à base noire; métathorax, sous l'écusson, d'un fauve luisant; balanciers testacés, massue verte; abdomen d'un brun noirâtre luisant, avec trois bandes transversales, arquées, élargies au milieu, atteignant les côtés, et sises à l'extrémité des segments, tantôt vertes, tantôt jaunâtres, 1er segment avec la base et les côtés de même couleur, une bande médiane étroite, plus large à sa base, allant du bord postérieur dudit 1er segment, verdâtre ou jaunâtre, allant jusqu'au bord postérieur du 2e segment, ensuite rougeâtre, 4e et 5e segments largement teintés de rougeâtre vers leur milieu, ventre d'un vert jaunâtre, avec l'extrémité et trois larges macules noirâtres; pieds d'un testacé fauve, plus foncé sur les cuisses, principalement sur les cuisses postérieures; ailes presque hyalines, un peu grisâtres à l'extrémité ainsi qu'au stigmate et largement d'un testacé pâle au bord externe ainsi que sur les nervures.

Brazil. — Ma collection.

Genre STRATIOMYS (Geoffr.).

1. S. DENTATA ♀ (mihi). — Long. 12 mill.

Nigro et flavido picta. Antennis nigris; facie et fronte parum tomentosis; fronte nigrâ, maculâ latâ, oblongâ, super antennas locatâ, flavâ; facie flavâ, strigâ mediană, et, utrinque, maculâ parvâ apud genas, nigris; occipite, orbiculis retrorsum dilatatis, flavis; thorace nigro, parce flavido tomentoso, lateribus densè flavido cinereo pilosis; scutello flavido, basi nigro, spinis fulvis; halteribus testaceis, apice viridi coloribus; abdomine flavo, glabro, segmento primo retrorsum, maculâ basali latâ bifidâ nigrâ, et, utrinque, nigro notato, segmentis, secundo et tertio retrorsum vittâ basali et profundè quadridentatâ, quarto, maculâ utrinque flavido ocutatâ, nigris; ventre pallido, segmentorum basi limbo lato, retrorsum bicrenato, nigro; pedibus fulvis, femoribus nigris; alis ferè hyalinis, externè testaceis.

Noire, variée de jaune. Antennes noires; face, front, occiput, jaunes, les deux premiers clair-semés d'un fin duvet jaunâtre, occiput, avec une petite bande médiane noire, au-dessus des antennes, une large bande

transversale, ornée au milieu d'une large macule ovalaire jaune, face avec une strie médiane, et, sur les joues, deux taches triangulaires, d'un noir luisant ; orbites fort élargis en arrière, jaunes ; thorax noir, avec un fin duvet jaunâtre, flancs couverts d'une villosité assez dense, d'un gris jaunâtre ; écusson jaune luisant, à base noire et pointes fauves ; balanciers testacés, massue verte ; abdomen jaune, 1er segment orné d'une large bande médiane, rétrécie et puis, échancrée à son extrémité, en outre, de chaque côté, avec une petite tache ovalaire, 2e et 3e avec une bande basilaire, n'atteignant pas les côtés, toutes les deux profondément crénelées en arrière, de façon à dessiner quatre longues dents, 5e, à la base et de chaque côté, avec une large macule arrondie, oculée de jaune, toutes d'un noir luisant, ventre d'un blanc jaunâtre, une large bande transversale à la base de chaque segment, n'atteignant pas les bords, élargie et échancrée au milieu, noire; pieds fauves, cuisses, sauf les genoux, noires ailes presque hyalines, bord externe et nervures, testacés.

Peut-être la ♀ de l'espèce suivante ?

California. — Ma collection.

2. S. LACERATA ♂ (mihi). — Long. 14 mill.

Antennis nigris; facie nigrâ, flavido satis densè villosâ; thorace nigro, flavido villoso; scutello flavo basi nigro, spinis flavidis; halteribus testaceis, apice obscurè viridulis ; abdomine nigro nitido, glabro, utrinque limbo flavo, intus irregulariter crenato, lineâ intermediâ, utrinque irregulariter sinuosâ, interruptâ, segmento secundo basi tertio, apice, flavo maculatis, quinto, utrinque flavo punctato, ventre flavido, segmentorum basi, utrinque limbo attenuato nigro; femoribus nigris, geniculis, tibiis tarsisque, fulvis ; alis pallidissimè flavis, venis et, extrinsecus, pallidè testaceis.

Antennes noires ; face noire, couverte de poils jaunes assez denses ; yeux à villosité grise, grisâtre derrière la tête ; thorax d'un noir luisant, assez densément revêtu de poils jaunes, plus denses sur les flancs ; écusson jaune à base noire, pointes jaunes; métathorax, sous l'écusson d'un noir luisant; balanciers testacés, massue verdâtre ; abdomen glabre, d'un noir luisant, les côtés à limbe jaune, très-irrégulièrement crénelé intérieurement, un point vers la base du 2e segment, une macule trans-

versale, étroite, à l'extrémité du 3e, une bande médiane étroite, irrégulière, sur le 4e, une bande semblable, un peu plus élargie, sinueuse, et une tache arrondie, de chaque côté, sur le 5e, toutes de couleur jaune; ventre d'un jaune pâle, avec une bande noire transversale, à la base de chaque segment, atténuée latéralement et n'atteignant pas les bords; cuisses noires, genoux, tibias et tarses, d'un testacé fauve, un peu de brunâtre vers le milieu des tibias; ailes d'un jaunâtre très-pâle, testacées au bord externe et sur les nervures.

Peut-être le ♂ de l'espèce décrite ci-dessus.

California. — Ma collection.

3. S. LAMBESSIANA ♀ (mihi). — Long. 13 mill.

Antennis nigris, facie testaceâ, albido villosâ; vertice ejusdem coloris et vittâ latâ nigrâ; thorace nigro fusco, albido villoso, pleuris albido densè villosis; scutello fusco, apice et spinis pallidè testaceis, lateribus ferè albis; abdomine castaneo nitido, apice et utrinque, pallidè testaceo trimaculato, maculis trigonis, maculis segmenti quarti retrorsum conjugatis, quintum, utrinque, ejusdem coloris; pedibus pallidè testaceis, femoribus apice, fusco notatis, tibiis anterioribus et intermediis apice, parum infuscatis; alis pallidè testaceis.

Antennes noires, face et front testacés, la première semée de duvet blanchâtre, vertex et front plus foncés au-dessus des antennes, une large bande transversale, noirâtre, atténuée à ses extrémités, sise derrière le vertex, jaunâtre; partie postérieure des orbites brunâtre avec les bords testacés, à duvet blanc; thorax noirâtre, avec un fin duvet blanchâtre, plus long et plus épais sur les flancs; écusson brun, bords et pointes testacés; balanciers blanchâtres; abdomen d'un brun luisant, côtés avec trois grandes macules triangulaires, sises aux bords postérieurs; marge du 4e segment d'un testacé pâle, 5e brun à la base, marge roussâtre, une large macule blanchâtre à son extrémité, ventre blanchâtre, base des segments brunâtre; pieds d'un testacé pâle, cuisses noirâtres à l'extrémité, principalement en dessous, tibias antérieurs et intermédiaires brunâtres vers l'extrémité; ailes un peu jaunâtres, stigmate roussâtre.

Algeria, Lambessa. — Ma collection.

4. S. ARMENIACA ♀ (mihi). — Long. 12 mill.

Antennis basi nigris (segmentum tertium ?); vertice nigro nitido; facie fere nudâ, testaceo pallido, super antennas vittâ transversali lineâque intermediâ longitudinali, latâ, nigris, ore et genis fuscanis; orbiculis margine dilatatis, testaceo nitido; thorace nigro opaco, scutello fulvo rubiginoso, basi nigro, spinis nigris, apice flavis; halteribus fuscis, apice flavidis; abdomine nigro opaco, in medio castaneo, pruinoso, segmento secundo maculâ, utrinque, trigonâ, tertio et quarto, vittâ posticâ, quinto ad apicem maculâ trigonâ, flavis, ventre pallido, segmentis basi, limbo lato nigro; pedibus fulvis, femoribus nigris; alis pallidè testaceis, venis fulvis.

Antennes, les deux premiers segments noirs (*les autres manquent ?*); vertex d'un noir luisant, front et face à peu près glabres, d'un jaune testacé, une ligne étroite, transversale, au-dessus des antennes, une large bande longitudinale sur la face, noires, bords de l'ouverture buccale et joues noirâtres; bords postérieurs des orbites fort élargis, d'un jaunâtre luisant; thorax d'un noir opaque, flancs couverts d'un fin duvet gris; écusson rougeâtre à base noire, épines noires à pointes jaunâtres; balanciers bruns, massue blanchâtre; abdomen d'un noir opaque, avec une large bande médiane d'un duvet roux pulvérulent, 2e segment, de chaque côté, avec une large macule triangulaire, sise au bord postérieur, 3e et 4e, avec une demi-bande postérieure, 5e, avec une grande macule presque triangulaire à l'extrémité, jaunes; ventre jaunâtre, avec une large zone noirâtre à la base de chaque segment; pieds fauves, cuisses noirâtres, genoux, tibias et tarses, fauves; ailes jaunâtres à nervures fauves.

Armenia. — Ma collection.

5. S. VELUTINA ♀ (mihi). — Long. 14 mill.

Antennis fuscis, segmento primo basi, latè rufo; vertice testaceo binotato, vittâ frontali sinuatâ, super antennali, nigrâ nitidâ, facie villosâ, supernè cinereâ, infernè albidâ; orbiculis retro argenteo marginatis; thorace sicut et scutello, parum flavido tomentosis, infernè cinereo villo-

sis, spinis testaceis ; abdomine nigro, utrinque vittis tribus angustis ad suturas locatis, cinereo flavido tomentosis, ventre nigro, in medio albido pruinoso ; halteribus fulvis ; pedibus fulvis, femoribus supernè infuscatis ; alis ferè hyalinis, extrinsecus pallidè infuscatis.

Antennes noirâtres, premier segment largement teint de rougeâtre à sa base; vertex d'un testacé luisant, avec une grande macule ocellifère, noire ; front orné d'une bande transversale sinueuse, au-dessus des antennes d'un noir luisant; face à duvet gris sous les antennes, vers le bas avec un duvet d'un blanc soyeux, une bande médiane étroite, noire; orbites bordés en arrière d'un liséré argenté; thorax, écusson, noirs, couverts d'un fin duvet pulvérulent fauve jaunâtre, flancs à villosité grisâtre ; pointes de l'écusson testacées; balanciers fauves; abdomen noir, bords latéraux des 2e, 3e et 4e segments, avec une demi-bande de duvet jaunâtre, placée sur la suture même ; ventre noir, couvert en son milieu d'un fin duvet pulvérulent blanchâtre; pieds fauves, cuisses brunes en dessus; ailes d'un jaune pâle, bord externe un peu roussâtre.

Chili. — Ma collection.

Genre ODONTOMYIA (Meig.).

1. O. ATROVIRENS ♂ (mihi). — Long. 12 mill.

Antennis basi nigris (segmentum tertium ?); facie testaceo fulvo, utrinque albido villosâ ; haustello nigro ; thorace nigro cinereo et parcè villoso, pleuris testaceis, albido villosis ; scutello prasino, basi nigro, spinis testaceis ; abdomine prasino, supernè nigro nitido latè vittato, vittâ parum crenatâ ; halteribus prasinis ; pedibus testaceis, femoribus anterioribus pallidè castaneis, retrorsum, apice, fuscis, tibiis basi, tarsisque parum infuscatis ; alis hyalinis, stigmate testaceo.

Antennes, les deux premiers articles noirs (*le 3e manque*); face fauve, à duvet blanc, joues jaunâtres, trompe épaisse, noire ; thorax d'un noir luisant, semé d'un fin duvet gris, flancs fauves, couverts de poils blanchâtres; écusson vert, à base noire et pointes testacées; balanciers verts; abdomen entièrement vert, avec une large bande médiane, légèrement dentelée sur

ses bords, d'un noir luisant; pieds testacés, avec un fin duvet blanc, cuisses, vers leur milieu, tibias, à l'extrémité, tarses, presque en entier, roussâtres; ailes hyalines, stigmate roussâtre, nervures du bord externe, fauves.

Nova-Zeland. — Ma collection.

2. O. PACHYCEPS ♂ (mihi). — Long. 8 mill.

Fronte convexâ, facie obtusè conicâ; antennis, basi fulvis (segmentum tertium ?); fronte et facie nitidis, prasinis, maculis quatuor latis, castaneis; thorace nigro, fulvo pruinoso, lateribus prasinis, obscurè castaneo notatis; scutello spinisque rufis; abdomine nigro nitido, vittâ intermediâ diffusâ, lateribus apice, subtus vittâ unicâ, prasinis, segmento quarto, utrinque et retrorsum, obscurè testaceo; pedibus testaceis; alis hyalinis, venis externis testaceis.

Vertex fort élargi ainsi que le front, tous deux arrondis en avant, face obtusément conique; antennes, les deux premiers articles fauves (*le troisième manque*); front et face d'un vert obscur, avec quatre larges macules un peu diffuses, roussâtres; bords postérieurs des orbites fauves; thorax noir, couvert d'un fin duvet pulvérulent jaune roussâtre, flancs et poitrine verts, avec quelques larges macules roussâtres peu distinctes; écusson et pointes rougeâtres; balanciers testacés, massue verte; abdomen luisant, noirâtre, le milieu, les côtés, les bords latéraux, l'extrémité, verts, une ligne dorsale noirâtre vers la base, 4e segment, au bord postérieur et sur les côtés, d'un fauve obscur, ventre verdâtre? (*détérioré*); pieds entièrement d'un testacé fauve; ailes hyalines; nervures costales, marginales et sous-marginales testacées.

Para. — Ma collection.

3. O. CLYPEATA ♀ (mihi). — Long. 8 mill.

Antennis fulvis, apice parum infuscatis; haustello nigro; orbiculis, vertice, fronte et facie fulvis, maculâ ocelliferâ nigrâ, lineâ, parum manifestâ, super antennas locatâ, et facie punctis duobus, fuscis; thorace nigro opaco, fulvo marginato, lateribus viridi-flavo, scutello spinisque

fulvis ; halteribus testaceis, apice prasinis ; abdomine testaceo, vittâ basali mediană fuscâ ad segmentum quartum evanescente, apice tandem fuscis ; pectore nigro ; pedibus fulvis, tarsis apice infuscatis ; alis hyalinis, venis pallidè flavis.

Antennes fauves, un peu brunâtres à l'extrémité ; trompe noire ; vertex, bords postérieurs des orbites, front et face fauves, une bande peu distincte, transversale, sise au-dessus des antennes, et, de chaque côté de la face (*un peu conique*), un point, brunâtres ; thorax d'un noir mat bordé de fauve, flancs d'un fauve qui tourne fréquemment au vert, poitrine noire ; écusson et pointes fauves ; abdomen testacé, une bande médiane noirâtre, atténuée en arrière et se terminant sur le 4e segment, bords, extrémité, brunâtres ; pieds fauves, tarses bruns à l'extrémité, ailes hyalines, d'un testacé pâle à la base et sur les nervures extérieures.

Amazonia. — Ma collection.

4. O. ANCHORATA ♂ (mihi). — Long. 7 mill.

Oculis ferè nudis. Antennis fulvis, apice parum infuscatis ; haustello nigro ; facie testaceo pallido ; thorace nigro, circum flavido et flavido pruinoso, pleuris fulvis et pectore nigro albido villosis ; scutello fusco, testaceo limbato, spinis testaceis, apice prasinis ; abdomine testaceo viridulo, maculâ basali anchoratâ, maculâque apicali trilobatâ, fuscis, apice prasino, marginibus prasinis, ventre fusco, maculis tribus testaceis ; pedibus testaceis, tarsis apice fuscis ; alis hyalinis.

Yeux à peu près nus. Antennes fauves, un peu brunâtres à l'extrémité ; face (*légèrement conique*) d'un testacé blanchâtre ; trompe noire ; thorax noirâtre, couvert d'un fin duvet pulvérulent jaunâtre, bords et flancs fauves, poitrine noire à poils blancs ; écusson d'un noirâtre luisant bordé de fauve, pointes testacées, massue verte ; abdomen d'un testacé verdâtre pâle à sa base, une grande macule en forme d'ancre avec les pattes renversées, et, vers l'extrémité, une autre grande macule, tridentée en avant, rejoignant la première par les côtés, toutes d'un brun roussâtre ; bord postérieur du dernier segment vert, ventre brun, avec trois grandes macules testacées, arrondies, les deux basilaires accouplées et la troisième sise à la partie médiane ; pieds testacés, extrémité des tarses

brunâtre; ailes hyalines, nervures costales et sous-marginales un peu jaunâtres.

Chili. — Ma collection.

5. O. PUNCTIFER ♀ (mihi). — Long. 9 mill.

Antennis fulvis, externè vix obscurioribus; orbiculis, vertice, fronte et facie, prasinis, suâ quisque lineâ tenui, transversali, undulatâ, et facie utrinque punctis tribus, fuscis; haustello testaceo, apice nigro; thorace fusco, fulvo pruinoso, lateribus et pleuris prasinis, pectore nigro; scutello viridulo, basi nigro, spinis testaceis; halteribus testaceis, apice prasinis; abdomine testaceo obscuro, vittâ latâ mediană, utrinque quadridentatâ et ante apicem evanescente, nigrâ, apice ventreque prasinis; pedibus fulvis, tarsis apice, tibiisque posticis apice, fuscis; alis hyalinis, costâ pallidè testaceâ.

Yeux nus, face un peu conique et nue. Antennes fauves, un peu brunâtres extérieurement ainsi qu'à leur extrémité; bords postérieurs des orbites, vertex, front et face, verts; trompe fauve, lèvres noires; vertex et front, chacun avec une strie transversale, face avec trois points de chaque côté, bruns; thorax noir, couvert d'un fin duvet pulvérulent fauve, côtés et flancs verts, poitrine noire; écusson vert, à base noire et pointes testacées; balanciers testacés, massue verte; abdomen d'un testacé obscur, une large bande médiane, quadridentée de chaque côté, se terminant obtusément au milieu du 5e segment, noirâtre, extrémité de ce 5e segment et ventre, verts; pieds d'un fauve pâle, extrémités des tibias postérieurs et de tous les tarses brunes; ailes hyalines, nervures costales, marginales et sous-marginales d'un testacé pâle.

Pays ?. — Ma collection.

Genre EXOCHOSTOMA (Macq.).

E. CALOCEPS ♀ (mihi). — Long. 10 mill.

Scutello mutico. Nigro et prasino picta; antennis nigris, facie prasinâ,

vittis duabus inter se occursantibus, verticis maculâ oblongâ magnâ, epistomi maculis tribus conjugatis parvis, lateralibus trigonis, mediamâ suboblongâ, nigris; thorace utrinque, vittâ ante abbreviatâ, limbo scutelli, pleuris, abdomine utrinque et apice limbo angusto, maculis tribus trigonis marginalibus cum limbo laterali conjugatis, ventre, halteribus apice, prasinis; pectore nigro; pedibus, præter femorum apicem extremum, tibia externè, tarsorum segmenti basalis basim, testaceis, nigris; alis pallidè fuscis, basi, externè venisque basalibus, obscurè fuscis.

Écusson mutique. Antennes noires; tête entièrement d'un beau vert, excepté : une grande macule, irrégulièrement ovalaire, sur le vertex, une macule, formée de deux bandes irrégulières, croisées en forme d'X, avec l'extrémité des branches supérieures coudées en dehors et les branches inférieures plus larges, irrégulières en dessous, trois petites macules conjuguées autour de l'épistome, les extérieures trigonales, allongées, l'intermédiaire en losange, noires; le reste du corps noir, excepté, thorax avec deux bandes latérales, n'atteignant pas le bord antérieur et prolongées jusqu'aux bords de l'écusson qu'elles entourent; flancs, ventre, bords et extrémité de l'abdomen, trois macules, de chaque côté, triangulaires, soudées aux bords latéraux et sises à l'extrémité des segments 2, 3 et 4, enfin, massue des balanciers, d'un beau vert; poitrine noire, avec une macule ovalaire verte de chaque côté, se fondant en avant avec la teinte noire de la poitrine; pieds noirs, excepté : genoux, bas des tibias, extérieurement, et base des premiers segments tarsiens, testacés, les tibias postérieurs testacés en dedans et en dehors, pelotes fauves, ainsi que la base des balanciers; ailes d'un brunâtre pâle plus foncé vers la base, stigmate brun, nervure costale fauve à la base, les autres noirâtres, surtout vers la base et autour de la cellule discoïdale.

Nonobstant l'absence de tuberculosités visibles aux bords de l'écusson, je crois pouvoir rapporter cette espèce au genre *Erochostoma* (Macq.), dont il présente tous les autres caractères.

Am. boreal., Colorado. — Ma collection.

Genre EVASA (Walker).

1. E. FLAVIPES ♀ (mihi). — Long. 7 mill.

Undique nigra, exceptis : antennis fuscis; tarsis apice ejusdem coloris : halteribus pallidè fulvis; alis cinereis, ad costam latè et dilutè infuscatis; spinis scutelli obscurè fulvis.

Entièrement d'un noir assez luisant, excepté : antennes, sauf le chète, brunâtres; pieds, sauf les derniers articles des tarses, teintés de brun, balanciers, d'un fauve pâle; pointes de l'écusson d'un fauve obscur; un peu de fin duvet gris sur le thorax et les flancs; ailes grises, bord largement brunâtre, cette nuance se fondant graduellement avec la couleur du disque.

India. — Ma collection.

2. E. ARGYROCEPS ♀ (mihi). — Long. 8 mill.

Nigra, nitida. Antennis fulvis, chæto fusco, fronte argenteâ; facie nigrâ; thorace retrorsum et lateribus, suturis, pleuris et pectore, argenteo tomentosis; scutello apice spinisque albidis; halteribus testaceis, apice fuscis; genientis, femoribus intermediis et posticis angustè, fulvis, tibiis, præter anteriores, basi albidis; alis cinereis, basi ferè hyalinis, extrinsecus ad apicem, dilutè fusco-nigro.

D'un noir assez luisant. Antennes fauves, chète obscur; face noire, front argenté; thorax nu, les côtés, le bord postérieur, la suture, les flancs et la poitrine, semés d'un fin duvet argenté : écusson, bord postérieur et les épines blancs; balanciers fauves, massue brune; base des cuisses légèrement teintée de fauve, cette nuance est un peu obscurcie sur les postérieures, genoux fauves, tibias intermédiaires, surtout les postérieurs, extérieurement couverts, à la base, d'un très-fin duvet blanc, pelotes blanchâtres; ailes claires, nervures brunes, extrémité largement grisâtre, plus foncées au bord externe.

Molucc. insulæ. — Ma collection.

3. E. FULVIVENTRIS ♂ (mihi). — Long. 8 mill.

Antennis, chæto et haustello fulvis; fronte et facie fuscis; thorace nigro nitido, humeris, lineâ et maculâ laterali, maculâ laterum, obscurè fulvis; scutelli spinis fulvis; halteribus fulvis; abdomine fulvo, utrinque et apice dilute fusco, obscurè metallico; pedibus fulvis, tarsis ferè totis, tibiis posticis, castaneo fusco; alis ferè hyalinis, extrinsecus pallidè cinereis, stigmate fusco.

Antennes, chète et trompe fauves; face et front d'un noirâtre mat; thorax d'un noir luisant, une tache humérale, une ligne très-fine latérale, une macule diffuse sur les flancs, d'un fauve obscur; épines de l'écusson et balanciers, fauves; abdomen d'un fauve rougeâtre luisant, teinté sur les côtés, ainsi qu'à l'extrémité, d'une nuance brune, avec de légers reflets violacés; pieds fauves, tarses antérieurs, presque en entier, intermédiaires et postérieurs, très-largement vers leur extrémité, tibias postérieurs, presque en entier, d'un brun roussâtre, pelotes grisâtres: ailes d'un gris très-pâle, plus foncées au bord externe, nervures et stigmate noirâtres.

Molucc. insulæ. — Ma collection.

4. E. PALLIPES ♂ (mihi). — Long. 6 mill.

Nigro nitido, exceptis: antennis testaceis (segmentum tertium ?); haustello fulvo; fronte, super antennas, albido notatâ; spinis scutelli testaceis; halteribus testaceis, apice fuscis; pedibus pallidè testaceis, tarsis anterioribus nigris; alis hyalinis, apice cinereis, stigmate fusco.

Entièrement d'un noir luisant, excepté: antennes testacées (3e *article manque*); un peu de blanc au-dessus des antennes; trompe fauve; épines de l'écusson testacées; balanciers testacés, bruns à l'extrémité; pieds d'un testacé très-pâle; tarses antérieurs noirs; ailes hyalines, grises à l'extrémité, plus foncées au bord externe, stigmate noirâtre.

Batchian insulæ. — Ma collection.

5. E. PICTIPES ♂ (mihi). — Long. 9 mill.

Nigro nitido, exceptis : antennis pallidè testaceis, chæto fusco ; fronte, super antennas, et, utrinque, parum argentatâ ; thorace cinereo tomentoso ; scutello apice spinisque ferè albis ; halteribus fulvis, apice fuscis ; ventre fusco nigro ; pedibus ferè albis, annulo femorum apicali, tibiis apicè, anterioribus ferè totis, fusco-castaneo, tarsis anterioribus fuscis ; alis ferè hyalinis, apice cinereis, costâ obscuriore, venis et stigmate fuscis.

Entièrement d'un noir assez luisant, excepté : antennes d'un blanc testacé, chète brunâtre ; front avec un peu de duvet argenté au-dessus et de chaque côté des antennes ; thorax semé d'un fin duvet grisâtre ; bords postérieurs de l'écusson et pointes, d'un blanc jaunâtre ; balanciers testacés, massue brune ; ventre d'un brun noirâtre foncé ; pieds blanchâtres, cuisses, un anneau près de l'extrémité, extrémité des tibias intermédiaires et postérieurs, bruns, tibias antérieurs bruns, tarses antérieurs noirs ; ailes presque hyalines, grisâtres au tiers postérieur et notablement plus grises vers le bord externe, stigmate brun.

Nova-Guinea. — Ma collection.

Genre SARGUS (Fabr.).

1. S. NIPHONENSIS ♀ (mihi). — Long. 16 mill.

Antennis nigris ; haustello testaceo ; facie fuscâ ; fronte æneâ ; thorace et scutello cæruleo æneo, lateribus nigris, flavido villosis ; halteribus fulvis, apice fuscis ; abdomine æneo, flavido villoso ; femoribus fuscis, tibiis anterioribus fulvo castaneo, basi fulvis, tarsis nigris, intermediis et posticis fulvis, maculâ fuscâ notatis, tarsis intermediis apice fuscis, posticis nigris, basi segmenti primi fulvâ ; alis obscurè cinereis, maculâ diffusâ, fuscanâ.

Thorax, écusson, d'un bleu verdâtre, abdomen d'un vert bronzé. Antennes noires, trompe testacée ; face noirâtre, front d'un vert bleuâtre, tous les deux couverts de longs poils bruns ; thorax couvert d'une villo-

sité jaunâtre, flancs d'un noirâtre luisant; balanciers fauves, massue brune; abdomen bronzé, clair-semé de longs poils jaunâtres; cuisses d'un brun foncé, tibias antérieurs brunâtres à base fauve, intermédiaires et postérieurs d'un fauve testacé, avec une macule interne, sise vers le milieu, brunâtre, tarses antérieurs noirâtres, intermédiaires fauves, noirâtres à l'extrémité, postérieurs noirs, base du 1er segment fauve, pelotes testacées; ailes d'un brun très-pâle, une large macule centrale, sise à la hauteur du stigmate, diffuse, brunâtre.

Niphon insul. — Ma collection.

2. S. PALLIPES ♀ (mihi). — Long. 8 mill.

Antennis, facie et haustello testaceis; fronte smaragdinâ, infernè albicante, vertice fuscano, villâ fulvâ; thorace scutelloque cupreo aurato, humeris et lineolâ lateralî testaceis; abdomine hyacinthino, subtus nigro metallico; halteribus fulvis; pedibus albido testaceo, tarsis posticis apice fuscis; alis hyalinis, dimidiâ parte, retro pallidè cinereâ, stigmate fusco pallido.

Thorax, écusson, d'un vert doré très-brillant; épaules et ligne latérale, allant de l'épaule à la base de l'aile, testacées; antennes, face et trompe, testacées; vertex brun à bande fauve, front, en dessus, d'un brun verdâtre métallique, blanc en dessous; balanciers fauves; abdomen d'un violet métallique brillant, ventre noirâtre, très-luisant; pieds d'un testacé blanchâtre, extrémité des tarses postérieurs brune; ailes hyalines, moitié postérieure un peu grisâtre, stigmate brunâtre.

Ceylan. — Ma collection.

3. S.? MAGNIFICUS ♀ (mihi). — Long. (sans la tête) 16 mill.

(*Caput ?*). *Thorace scutelloque cærulescentibus; abdomine cupreo hyacinthino; thorace flavido pruinoso, humeris, angulis posticis, lineolâque laterali testaceis; halteribus testaceis; abdomine aurato, basi, utrinque flavido villoso, ventre hyacinthino; pedibus fulvis, tarsis anterioribus infuscatis, femoribus intermediis fulvis (tibiæ ?), femoribus posticis fulvis,*

apicè latè fuscis, tibiis posticis fuscis, apice, et, annulo, fulvis, tarsis fuscis ; alis fuscis, basi et intus pallidioribus.

(*La tête, ainsi que les tibias intermédiaires manquent*). — Thorax, écusson, d'un bleu verdâtre métallique, couverts d'une villosité fauve, flancs à reflets violacés, épaules, angles postérieurs et ligne latérale très-fine, d'un testacé obscur; abdomen d'un cuivreux doré très-brillant à reflets pourprés, un peu de duvet fauve de chaque côté, surtout à la base, ventre d'un beau violet ; balanciers fauves ; pieds antérieurs fauves, tarses un peu brunâtres, cuisses intermédiaires fauves, postérieurs semblables, avec l'extrémité largement brunâtre, tibias postérieurs brunâtres, avec l'extrémité et un anneau intermédiaire, fauves, tarses noirâtres, pelotes et duvet sous les tarses, fauves; ailes d'un brun foncé, un peu plus clair aux bords internes et à la base.

Assam. — Ma collection.

4. S.? PAPUANA ♀ (mihi). — Long. (sans la tête) 9 mill.

(*Caput ?*) *Undique fulvus, exceptis : pleuris pallidis : halteribus apice fuscanis ; abdomine apice vittisque duabus, fusco obscuro ; pedibus posticis fusco castaneo, intermediis, basi tibiarum, tarsorum apice, latè fuscanis, tarsis anterioribus apicè fuscis ; alis cinereis, dilutè et pallidè infuscatis.*

(*La tête manque*). Entièrement d'un fauve testacé avec les flancs plus pâles, excepté : milieu du thorax un peu roussâtre, ainsi que l'extrémité des balanciers; abdomen avec deux larges bandes transversales basilaires, atténuées latéralement, brunes, sur les 2e et 3e segments, le 4e et les derniers entièrement d'un brun noirâtre, ventre fauve, avec l'extrémité noirâtre ; pieds postérieurs entièrement bruns, sauf les hanches qui sont testacées, les tibias intermédiaires bruns à la base, tarses intermédiaires bruns, sauf le 1er segment, tarses antérieurs brunâtres à l'extrémité; ailes grises, un peu brunâtres vers le bord externe.

Nova-Guinea. — Ma collection.

5. S. SPLENDENS ♀ (mihi). — Long. (sans la tête) 13 mill.

(*Caput ?*) *Undique hyacinthino nitente, exceptis : humeris, lineolâ laterali, testaceis ; metathorace testaceo, utrinque albido ; halteribus testaceis, apice fuscanis ; pedibus testaceis, femoribus posticis et intermediis, apice, latè castaneis, tibiis posticis basi, tarsis posticis apice latè infuscatis ; alis cinereis, venis et stigmate obscurè fuscis.*

(*La tête manque*). Entièrement d'un brillant violet métallique, excepté : le bord antérieur du thorax, les épaules, la petite ligne latérale, testacés, flancs un peu roussâtres; métathorax, sous l'écusson, testacé blanchâtre latéralement ; balanciers testacés, massue brune; hanches noires ; pieds testacés, cuisses intermédiaires avec une large macule roussâtre à l'extrémité, postérieures avec la moitié apicale brune, tibias postérieurs à base brunâtre, tarses postérieurs roussâtres, brunâtres à leur extrémité ; ailes grises, nervures et stigmate noirâtres.

Mexicus. — Ma collection.

6. S. NIGRIBARBIS ♂, ♀ (mihi). — Long. 9 mill.

Æneo nitido, exceptis : antennis nigris ; facie nigrâ et nigro densè villosâ ; thorace flavido villoso ; halteribus testaceis ; pleuris parum cinereo villosis ; femoribus, apice et subtus, tibiis tarsisque nigris ; alis obscurè cinereis, venis, et, extrinsecus, dilutè infuscatis.

Entièrement d'un vert métallique très-brillant, excepté : antennes noires ; face noire, densément couverte de poils noirs ; front à poils noirs, vertex à villosité jaunâtre ; thorax avec un fin duvet jaunâtre et flancs avec un peu de duvet blanchâtre; balanciers testacés; cuisses d'un vert métallique, noires en dessous, à l'extrémité, ainsi qu'aux genoux, tibias et tarses noirs, avec un fin duvet jaunâtre, pelotes grises ; ailes d'un brunâtre clair, nervures et stigmate d'un brun foncé. *La taille varie.*

California. — Ma collection.

Genre MACROSARGUS (olim *Pedicella*, mihi).

1. M. TENUIVENTRIS ♀ (mihi). — Long. 10 mill.

Thorace æneo, abdomine fusco, nitido. Antennis, haustello et fronte, testaceis; facie æneascente, oculis cohærentibus; thoracis lineolâ laterali obscurè fulvâ; scutello cærulescente; halteribus testaceis, apice fuscis; abdomine basi, subtus et utrinque, albido limbato, tomento fulvo vestito; pedibus testaceis, tibiis posticis obscurè fusco annulatis, tarsis posticis apicè fuscanis; alis cinereis.

D'un vert doré, souvent à reflets cuivreux; abdomen brunâtre, avec des reflets pourprés; antennes, front et trompe fauves; vertex bronzé, à poils noirs; face bronzée, un peu de fauve à la base des antennes; thorax à duvet fauve, une ligne latérale fine, fauve, allant de l'épaule à la base de l'aile; écusson violacé; balanciers testacés, massue brune; abdomen avec une demi-bande transversale blanchâtre, de chaque côté du 1er et du 2e segments, parfois peu distincte, les suivants, aux bords postérieurs, et principalement sur les côtés, couverts d'un duvet fauve; hanches noires; pieds fauves, cuisses postérieures brunâtres à l'extrémité, tibias postérieurs avec un anneau, souvent peu distinct, brunâtre; ailes brunâtres, stigmate plus foncé.

Amazonia. — Ma collection.

2. M. RUFIBASIS ♀ (mihi). — Long. 11 mill.

Antennis fulvis, vertice et fronte æneis, fronte subtus testaceâ, vertice nigro piloso; facie obscurè æneascente, supernè testaceâ; haustello testaceo; thorace æneo lineolâ laterali testaceâ; metathorace maculis utrinque subalbis; halteribus castaneis; pleuris cinereo tomentosis; abdomine hyacinthino, segmentis primis et secundis fulvis, utrinque fuscis, tertiis, quartis et quintis, utrinque, retrorsum, tomento cinereo notatis; pedibus testaceis, femoribus intermediis basi fuscis, posticis fuscis, basi et apice fulvis, tibiis nigris, albido latè annulatis, tarsis nigris, segmento basilari albido; alis ferè hyalinis, stigmate castaneo.

Antennes fauves, bas du front, ainsi que le haut de la face, testacés; vertex et front verts à poils noirs; bas de la face un peu verdâtre; trompe fauve; thorax, écusson, d'un vert brillant, disque semé de duvet fauve, duvet gris sur les flancs, de chaque côté, une ligne très-fine fauve, allant de l'épaule à la base de l'aile; métathorax, sous l'écusson, avec une large macule blanchâtre de chaque côté; balanciers brunâtres; abdomen violet, 1er et 2e segments fauves à la base, avec les côtés d'un brun à reflets cuivreux, 3e, 4e et 5e, en arrière, avec un peu de duvet gris de chaque côté; hanches noires; pieds testacés, cuisses intermédiaires noirâtres à la base, postérieures brunes, testacées à la base ainsi qu'à l'extrémité, tibias et tarses blanchâtres, avec leurs extrémités noirâtres; ailes presque hyalines, stigmate brun.

Amer. merid. — Ma collection.

3. M. SMARAGDIFERUS ♀ (mihi). — Long. 9 mill.

Undique fulvus, exceptis : maculâ ocelliferâ nigrâ; facie utrinque flavâ; thorace vittis tribus latis, lateribus interruptis, scutelli maculâ basali, nigris; metathorace smaragdino; humeris lineolâ laterali maculisque utrinque flavis; abdomine vittis quatuor latis, nigris; alis testaceis, intus et apice pallidioribus.

Entièrement fauve, excepté : une tache noire ocellifère; face jaune; de chaque côté des antennes existent deux petites lignes noirâtres, sises vers le haut, aux bords internes des orbites; thorax avec trois larges bandes longitudinales noires, l'intermédiaire parfois double, les latérales interrompues à la suture; épaules, ligne latérale, trois ou quatre macules sur les flancs, d'un jaune brillant, une large macule diffuse, brunâtre, sise au-dessous de la ligne latérale; écusson à base noire; métathorax, sous l'écusson d'un beau vert brillant métallique; abdomen avec quatre larges bandes transversales noirâtres, un peu atténuées sur les côtés vers la base des 2e, 3e, 4e et 5e segments, et s'élargissant de plus en plus vers l'extrémité de l'abdomen; cuisses postérieures ordinairement pâles, mais parfois très-légèrement teintées, en dessus, d'un roux pâle; ailes testacées, plus pâles à l'extrémité, ainsi qu'aux bords internes.

Cette espèce diffère surtout de ses analogues, par la brillante coloration du métathorax, sous l'écusson.

Mexicus. — Ma collection.

Genre CHRYSONOTUS (Lœw).

1. C. CALOPUS ♀ (mihi). — Long. 8 mill.

Undique niger, exceptis : antennis fulvis ; haustello testaceo ; fronte nigrâ, utrinque nitidâ ; facie nigrâ ; lineolâ transversali albidâ, super antennas locatâ ; thorace fulvo, parcè pruinoso, scapulis, lineolâ laterali, testaceis ; abdominis segmentis basi parcè cinereo tomentosis ; halteribus fulvis ; pedibus testaceis, intermediis et posterioribus, femoribus latè, tarsis apice et angustè fuscis ; alis ferè hyalinis, stigmate fusco.

Entièrement d'un noir peu luisant, excepté : antennes fauves, trompe testacée ; vertex et front d'un noir luisant, avec une bande médiane, opaque ; thorax avec un peu de duvet pulvérulent jaunâtre, une ligne très-fine latérale, épaules, d'un fauve obscur ; balanciers fauves ; abdomen avec un peu de duvet gris à la base des segments ; pieds d'un testacé pâle, cuisses intermédiaires un peu roussâtres, brunâtres à l'extrémité, postérieures plus largement noirâtres à leur extrémité, tarses intermédiaires et postérieurs avec le dernier article noirâtre ; ailes presque hyalines, stigmate brun.

Natal. — Ma collection.

2. C. FLAVOPILOSUS ♂, ♀. — Long. 10 mill.

Cuprinus, undique flavido satis densè villosus ; antennis fulvis, basi et clæto parum infuscatis ; vertice hyacinthino, fronte nigro cæruleo, maculâ albidâ super antennas locatâ ; facie nigro cæruleo ; haustello albido ; thoracis disco scutelloque, æneseentibus, pleuris nigrocæruleis, lineolâ laterali castaneâ ; abdomine cupreo-aurato, apice hyacinthino, ventre nigro ; halteribus testaceis ; pedibus testaceis, posticorum femoribus latè fuscis,

tibiis apice fusco annulatis, tarsis apice castaneis; alis pallidè flavis, stigmate pallidè fusco.

Entièrement à reflets métalliques et parsemé de poils jaunâtres assez longs, excepté : antennes fauves, extrémités des deux premiers segments et chète, brunâtres; trompe blanchâtre; vertex violacé, front et face d'un noir bleuâtre, parsemés de poils bruns, une macule blanche au-dessus des antennes; disque du thorax, écusson, d'un vert doré, flancs d'un bleu noirâtre, une ligne latérale très-fine, d'un testacé brunâtre; abdomen d'un cuivreux doré avec reflets violacés à l'extrémité, ventre noir; balanciers testacés; pieds d'un testacé pâle, hanches noires, un point brun à la base des cuisses, postérieures largement noirâtres à l'extrémité, un anneau brun aux tibias postérieurs, tous les tarses avec les derniers articles un peu brunâtres.

Mexicus. — Ma collection.

3. C. FULVITHORAX ♀ (mihi). — Long. 7 mill.

Nitens, testaceus, exceptis : antennis et facie fulvis; vertice et fronte cæruleis, maculâ flavidâ, super antennas locatâ; pleuris castaneo univittatis, pectore castaneo; abdomine hyacinthino, basi vittisque tribus transversalibus latis, ferè trigonis, testaceis; halteribus testaceis; pedibus testaceis, femoribus anterioribus fusco pallidè annulatis; alis cinereis.

D'un testacé luisant; antennes et face fauves; vertex et front, d'un bleu luisant, une macule jaunâtre au-dessus des antennes; flancs avec une bande transversale et poitrine, brunâtres; balanciers testacés, massue brunâtre; abdomen d'un beau violet métallique, la base ainsi que trois grandes macules transversales, en forme de triangle allongé, testacées; pieds testacés, cuisses antérieures avec un anneau brunâtre pâle; balanciers testacés; ailes grisâtres, plus pâles à la base.

Amazonia. — Ma collection.

Genre MEROSARGUS (Lœw).

1. M. FRATERNUS ♀ (mihi). — Long. 6 mill.

Niger. Antennis fulvis, chæto nigro; haustello albido flavo; fronte

nigrâ, punctis geminis super antennas locatis, argenteis; facie pallidè testaceâ; humeris, lineolâ laterali, angulis posticis, testaceis, pleuris ejusdem coloris, fusco latè notatis, pectore fusco; scutello apice testaceo; halteribus ferè albis; abdominis segmentis, primo basi, secundo basi, utrinque et apice, testaceis, ventre ferè albido; pedibus pallidè testaceis, tibiis anteriorum, apice, latè, tarsisque totis, intermediorum tibiis et tarsis, apice femoribus posticorum, annulo lato, apicali, et tibiis totis, tarsis apice, fuscis; alis ferè hyalinis, venis fuscis,

D'un noir peu luisant. Antennes fauves, chète noir (*brièvement velu à sa base*); trompe d'un blanc jaunâtre; front d'un noir peu luisant, deux points argentés au-dessus des antennes; face testacée; thorax, avec les épaules, la ligne latérale et les angles postérieurs fauves, flancs testacés, avec une large macule et poitrine brunes; écusson testacé à son extrémité; balanciers d'un testacé pâle; abdomen, base du 1er segment, 2e et 3e avec les angles antérieurs et postérieurs ainsi que les bords postérieurs, les angles antérieurs des 4e et 5e, testacés, ventre d'un testacé pâle; pieds de même couleur, antérieurs avec les tibias, sauf à leur base, les tarses en entier, bruns, intermédiaires, tibias, extrémité des tarses postérieurs, avec les cuisses, largement, en leur milieu, les tibias presque en entier, les tarses à l'extrémité, d'un brun noirâtre; cuisses grisâtres, stigmate d'un roux brunâtre.

Mexicus. — Ma collection.

2. M. CALCEOLATUS ♀ (mihi). — Long. 8 mill,

Thorace fusco nigro; abdomine fulvo. Antennis castaneo fusco; fronte et facie nigris, lineolâ transversali super antennas locatâ, albidâ; haustello pallidè testaceo; thoracis humeris lineolâ laterali, angulis posticis et apice scutelli, fulvo obscuro; halteribus testaceis; abdomine fulvo rubiginoso, basi, apice latè, vittisque duabus transversalibus, fuscis; pedibus fuscis, anteriorum trochanteribus, tibiis fusco annulatis, tarsorumque basi pallidè testaceis, intermediorum et posticorum basi geniculisque, pallidè testaceis, tarsorum segmento primo albido; alis pallidè testaceis.

Thorax d'un noir brun, abdomen d'un fauve rougeâtre. Antennes brunâtres; trompe d'un blanc testacé; face et front noirs, une ligne transver-

sale très-fine sise au-dessus des antennes, blanche; épaules, ligne latérale, angles postérieurs du thorax, d'un fauve obscur; extrémité de l'écusson de même nuance; balanciers testacés; abdomen, base du 1er segment, base et côtés du 2e et base du troisième, largement, les derniers tout entiers, d'un brun noirâtre luisant, ventre avec la base, les côtés et l'extrémité de la même nuance; hanches antérieures testacées; cuisses antérieures noirâtres, avec la base et l'extrémité testacées, genoux testacés, tibias de même couleur, avec un large anneau noirâtre, les pieds intermédiaires et postérieurs noirâtres, avec la base des cuisses et les genoux testacés, tous les tarses bruns, avec le premier article blanchâtre; ailes jaunâtres.

Mexicus. — Ma collection.

Genre PLECTICUS (Lœw).

1. P. FLAVICEPS ♀ (mihi). — Long. 14 mill.

Fulvus et fusco variegatus. Antennis et haustello fulvis ; fronte et facie albido flavo ; thorace pallidè fusco, vittis quinque pallidè fuscis, lateribus testaceis ; scutello fulvo, vittâ nigrâ transversali ; halteribus testaceis, apice fuscis ; abdomine fulvo, vittis quatuor latis, obscure fuscis, colore castaneâ interruptis ; pedibus fulvis, tarsis anterioribus apice latè fuscis ; alis pallidè flavis, extrinsecus latè testaceis.

Fauve, varié de brunâtre. Antennes et trompe fauves; face et front d'un blanc jaunâtre luisant; thorax fauve, avec cinq bandes longitudinales brunâtres, n'atteignant pas le bord antérieur, les deux latérales très-courtes, étroites, noirâtres, angles postérieurs d'un fauve luisant, côtés testacés; écusson fauve, avec une large bande transversale noirâtre; balanciers fauves; abdomen fauve, avec quatre larges bandes transversales noirâtres, un peu roussâtres dans leur milieu, légèrement rétrécies sur les côtés, ventre fauve, avec l'extrémité et deux bandes, noirâtres; pieds testacés, extrémité des tarses noirâtre, pelotes testacées; ailes d'un jaune pâle, largement testacées au bord externe.

Mexicus. — Ma collection.

2. P. Doleschalii ♂ (mihi). — Long. 12 mill.

Fulvus. Antennis basi fuscis (segmentum tertium?); haustello fulvo; occipite nigro; facie cinereâ; thoracis disco rufo; segmentis abdominis, in medio, vittis quatuor, utrinque abbreviatis, nigris; genitalibus nigris; tarsis apice, latè, tibiis tarsisque totis, nigris; halteribus testaceis, apice fuscis; alis ferè hyalinis, apice pallidè cinerascentibus, venis basi testaceis.

Le laconisme trop fréquemment regrettable des diagnoses publiées par divers auteurs, tels que les Walker, les Doleschal, etc., ne me permet pas d'*affirmer* la *nouveauté* de cette espèce ; voici, toutefois, la description du seul spécimen que je possède.

Entièrement d'un fauve testacé, excepté : vertex d'un noir luisant, face et front d'un gris blanchâtre (*le 3e article des antennes manque*) ; disque du thorax légèrement teinté de roussâtre; balanciers à massue brune ; 2e, 3e, 4e et 5e segments, avec une large macule ovalaire, allongée et située vers le milieu de l'arceau dorsal, d'un noir brun ; organe ♂, fort saillant, noirâtre ; la même couleur teint les tibias et les tarses postérieurs, de même que les derniers segments des tarses antérieurs et intermédiaires ; ailes presque hyalines, très-légèrement teintées de grisâtre vers l'extrémité, nervures d'un brun pâle, testacées à la base.

Mysol, ins. — Ma collection.

Genre MICROCHRYZA (Lœw).

M.? gemma ♀ (mihi). — Long. 3 mill.

Undique cuprina, exceptis : antennis fulvis ; fronte hyacinthinâ ; thoracis lineolâ laterali testaceâ ; halteribus fulvis ; pedibus testaceis ; femoribus tibiisque intermediis obscurè fusco pallido notatis, femoribus tibiisque posterioribus latè fusco annulatis, tarsis ferè albidis, apice parum infuscatis, alis albicantibus.

Ne possédant qu'une ♀, je rapporte avec doute cet individu au genre

Microchryza (Lœw). Peut-être serait-il mieux à sa place dans le genre *Chrysomyia ?*

Yeux nus. Entièrement d'un beau vert brillant, métallique, excepté : antennes fauves ; *front très-large*, violet métallique ; une ligne latérale, très-fine, allant de l'épaule à la base de l'aile, testacée ; balanciers fauves ; pieds testacés, cuisses et tibias intermédiaires, obscurément marqués de brunâtre pâle vers leur milieu, cuisses postérieures, au milieu, largement brunes et tibias bruns à l'extrémité, tarses intermédiaires et postérieurs blanchâtres, avec l'extrémité brunâtre ; ailes blanchâtres, nervures externes testacées.

Ceylan. — Ma collection.

Genre NEMOTELUS (Geoffroy).

1. N. COTHURNATUS ♂ (mihi). — Long. 5 mill.

Oculis nudis, rostro conico et modicè elongato. Thorace nigro nitido, abdomine albido flavo, nigro notato ; fronte, facie et rostro, nigro nitido, antennis nigris ; puncto humerali minuto albido ; halteribus fuscis, apice pallidis ; abdominis segmento basali nigro, secundo in medio, basi, ejusdem coloris, quarto maculâ utrinque ferè oblongâ, cum segmenti quinti margine, latâ, retrorsum conjuncta, nigris, segmentis ultimis basi nigris, ventre albido flavo, limbo utrinque lato, nigro ; geniculis et basi tarsorum testaceis ; alis hyalinis.

Yeux nus, rostre conique ; médiocrement allongé ; antennes noires ; front, face et rostre, entièrement d'un noir luisant, *sans macules ;* thorax, écusson, d'un noir luisant, un point blanchâtre aux épaules ; balanciers blanchâtres à base brunâtre ; abdomen d'un blanc jaunâtre, 1^er^ segment noir, la couleur noire s'étendant un peu sur la partie basilaire du 2^e^ segment, 4^e^ segment avec deux grandes taches noires, irrégulièrement oblongues, se confondant avec une large zone noire située à la base du 5^e^, derniers segments bordés de noir, ventre noirâtre, avec une très-

large macule, arrondie au milieu; pieds noirs, genoux, base des tarses, largement fauves; ailes hyalines.

Hispania. — Ma collection.

2. N. HIRTULUS ♂, ♀ (mihi). — Long. 5 mill.

♂. Niger. Tomento thoracico cinereo, facie obtusâ, vix prominulâ; fronte et facie tomento nigro cinereo tectis; halteribus testaceo flavido, basi fuscis; femoribus apice, tibiis basi et apice, fulvis, genitalibus testaceis; tarsis testaceis, apice parum infuscatis; alis pallidè albidis.

♀. Simillimâ, fronte et facie nudis; genitalibus fulvis; abdomine parcè et breviter cinereo tomentoso; halteribus apice fulvis.

♂. Entièrement d'un noir assez luisant, excepté : tête et face couvertes d'une villosité grisâtre, thorax à poils gris; *face à peine saillante*; balanciers blanchâtres, à bases brunâtres; extrémité des cuisses, base et extrémité des tibias, fauves; tarses testacés, avec l'extrémité brunâtre; ailes blanchâtres, organes ♂ testacés.

♀. Semblable au mâle, excepté : front large et luisant ainsi que la face, tous deux à peu près nus; balanciers fauves au sommet; abdomen clair-semé d'un fin duvet grisâtre; organes ♀ fauves.

Natal. — Ma collection.

3. N. NIGER ♀ (mihi). — Long. 4 mill.

Facie modicè conicâ : niger, nitidus, exceptis : lineolâ frontali, utrinque, albido flavo; halteribus pallidè testaceis, basi parum infuscatis; femoribus nitidis apice, tibiis basi et apice, angustè testaceis, tarsis albidis, apice fuscis; alis ferè albidis.

Face médiocrement conique. Entièrement d'un noir luisant, excepté : une petite bande transversale étroite, interrompue au milieu, sise vers le bas du front, blanchâtre; balanciers d'un testacé pâle, avec la base un peu brunâtre; pieds testacés, cuisses à l'extrémité, genoux, tibias à la

base et à l'extrémité, testacés; tarses blanchâtres, extrémité brune; ailes blanchâtres, nervures testacées au bord externe.

Chili. — Ma collection.

4. N. RUFICORNIS ♀ (mihi). — Long. 5 mill.

Facie modicè conicâ. Totus niger nitidus, exceptis : antennis fulvis, apice nigris ; puncto utrinque albido, super antennas locatis ; thoracis scapulis, lineolâ laterali angulis posticis, testaceis; halteribus albidis; abdomine utrinque testaceo pallido irregulariter limbato, segmentis, quarto utrinque, quinto lineolâ basilari, sexto et cæteris, ejusdem coloris marginatis, ventre nigro ; pedibus nigris, femoribus apice et geniculis testaceis, tibiis testaceis, posticis latè fusco annulatis, tarsis testaceis, apice vix infuscatis ; alis subalbis.

Face médiocrement conique, front très-large. Entièrement d'un noir assez luisant, excepté : antennes fauves, chète noirâtre; front, avec deux points blancs de chaque côté, au-dessus des antennes ; thorax, épaules, ligne latérale, angles postérieurs, d'un blanc testacé ; balanciers blancs ; abdomen, avec les bords latéraux irrégulièrement bordés d'un testacé blanchâtre luisant, bords postérieurs du 3e segment avec deux points, base du 4e avec deux lignes transversales, étroites, marges postérieures des derniers segments de même nuance; ventre noir ; extrémité des cuisses, genoux, base, extrémité des tibias, testacés, tibias intermédiaires et postérieurs, en leur milieu, roussâtres, tarses testacés avec le dernier segment brunâtre; ailes blanchâtres, nervures externes testacées.

Chili. — Ma collection.